Bebekler için Aşılama

Ebeveynler için Kılavuz

Bunlar bebeğiniz için gereken aşılar!

Doğumda[1,2]	**HepB**		**RSV-mAb[1]** 0–7 ay														
2 aylıkken[1,2]	**HepB** 1–2 ay[2]	+	**DTaP**	+	**KPA**	+	**Hib**	+	**Çocuk felci**	+	**RV**						
4 aylıkken[1,2]	**HepB[3]**	+	**DTaP**	+	**KPA**	+	**Hib**	+	**Çocuk felci**	+	**RV**						
6 aylıkken[1,2]	**HepB** 6–18 ay[2]	+	**DTaP**	+	**KPA**	+	**Hib[4]**	+	**Çocuk felci** 6–18 ay[2]	+	**RV[5]**	+	**Influenza[6]**	+	**COVID[7]**		
12 aylık ve daha büyük[1,2]	**KKK** 12–15 ay[2]	+	**DTaP** 15–18 ay[2]	+	**KPA** 12–15 ay[2]	+	**Hib** 12–15 ay[2]	+	**Suçiçeği** 12–15 ay[2]	+	**HepA[8]** 12–23 ay[2]	+	**Influenza[6]**				

Bebeğinizin tüm aşıları zamanında yapıldığından emin olmak için doktorunuza veya hemşirenize danışınız. Aşılar iğne sayısını azaltmak için genellikle birleştirilirler. Bebeğinize yapılan aşıların tarihlerini gösteren kayıt kartını mutlaka isteyiniz ve bu kartı her ziyaretinizde yanınızda getiriniz.

İşte bebeğinizin korunacağı hastalıkların listesi:

HepB: hepatit B, ağır bir karaciğer hastalığı

DTaP: difteri, tetanos (kazıklı humma) ve pertusis (boğmaca)

KPA: konjuge pnömokok aşısı ağır bir kan, akciğer, ve beyin enfeksiyonuna karşı korur

Hib: *Haemophilus influenzae* tip b, ağır bir beyin, boğaz, ve kan enfeksiyonu

Çocuk felci: çocuk felci, ağır, felç edici bir hastalık

RSV: respiratuar sinsityal virus, ağır bir akciğer enfeksiyonu

RV: ağır bir ishal hastalığı olan rotavirüs enfeksiyonu

İnfluenza: ağır bir akciğer enfeksiyonu

KKK: kızamık, kabakulak, ve kızamıkçık

COVID-19: ağır ve oldukça bulaşıcı bir hastalık

HepA: hepatit A, ağır bir karaciğer hastalığı

Suçiçeği: varisella da denir

Yukarıdaki çizelge için notlar:

1. Ekim'den Mart'a kadar, doğumdan 7 aya kadar olan bebeklerin, eğer hamilelik sırasında RSV aşısı yapılmadıysa, RSV önleyici antikora (RSV-mAb) ihtiyacı olabilir. 8 ilâ 19 aylık bebeklerin bazılarının, yaşamlarının ikinci RSV sezonunda RSV-mAb'ye ihtiyacı olabilir.
2. Bu, aşının yapılması gereken yaş aralığıdır.
3. Kullanılan aşıya bağlı olarak, bebeğinize 4 aylıkken bir doz Hep B aşısı gerekmeyebilir. Doktorunuza veya hemşirenize danışınız.
4. Kullanılan aşıya bağlı olarak, bebeğinize 6 aylıkken bir doz Hib aşısı gerekmeyebilir. Doktorunuza veya hemşirenize danışınız.
5. Kullanılan aşıya bağlı olarak, bebeğinize 6 aylıkken bir doz RV aşısı gerekmeyebilir. Doktorunuza veya hemşirenize danışınız.
6. 6 aylık ve daha büyük tüm çocuklar her yılın sonbaharında veya kışında influenzaya karşı aşılanmalıdır.
7. Yapılan COVID-19 aşısının markasına bağlı olarak, çocuğunuza 2 veya 3 doz gerekecektir.
8. Çocuğunuza, en az 6 ay arayla yapılmak üzere, 2 doz HepA aşısı gerekecektir.

Turkish translation provided by Betül Polatdemir, MD, BC Children's Hospital, Vancouver, British Columbia, Canada and Nur Polatdemir Çevik, Near East University, Nicosia, Cyprus