

សន្លឹកព័ត៌មានស្តីពីថ្នាំវ៉ាក់សាំង

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Meningococcal ACWY៖ តើលោកអ្នកត្រូវដឹងអ្វីខ្លះ

Many Vaccine Information Statements are available in Khmer and other languages. See www.immunize.org/vis

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃព័ត៌មានអំពីថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាច្រើនគឺអាចរកបានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាផ្សេងទៀត។
ចូលមើល www.immunize.org/vis

1. ហេតុអ្វីត្រូវចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង?

ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Meningococcal ACWY អាចជួយបង្ការ ជំងឺ meningococcal ដែលបង្កឡើងដោយបាក់តេរី serogroups A, C, W, និង Y។ មានថ្នាំវ៉ាក់សាំង meningococcal ផ្សេងៗ ដើម្បីជួយការពារបាក់តេរី serogroup B។

ជំងឺ Meningococcal នេះអាចបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺរលាកស្រោមខួរ (ការឆ្លងមេរោគលើស្រោមខួរក្បាល និងឆ្អឹងខ្នង) និងការឆ្លងមេរោគក្នុងឈាម។ សូមអ្នកត្រូវពេលគេកំពុងព្យាបាលជំងឺនេះ ក៏ជំងឺ meningococcal បានសម្លាប់មនុស្ស 10 ទៅ 15 នាក់ ក្នុងចំណោម 100 នាក់ ដែលកើតជំងឺនេះ។ អ្នកទាំងឡាយ ដែលរស់រានមានជីវិត គឺប្រហែល 10 ទៅ 20 នាក់ ក្នុងចំណោម 100 នាក់ នឹងមានបញ្ហាពីការភាពដូចជា បាត់បង់ការស្តាប់ ខូចខាតខួរក្បាល ខូចខាតតម្រងនោម បាត់បង់អវយវៈ បញ្ហាប្រព័ន្ធប្រសាទ ឬស្លាកស្នាមធ្ងន់ធ្ងរ ដោយសារការរីកកាន់កាប់ប្រូស្តេក។

ជំងឺ Meningococcal ហាក់ដូចជាកម្រ និងឆ្លាក់ថយចុះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីទសវត្សរ៍ 1990។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វាក៏ជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការបាត់បង់ជីវិត ឬពិការភាពយូរអង្វែងចំពោះអ្នកដែលកើតជំងឺនេះ។

មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចកើតជំងឺ meningococcal មនុស្សមួយចំនួនមានហានិភ័យខ្ពស់ រួមមាន៖

- កុមារអាយុក្រោមមួយខួប
- ក្មេងជំទង់ និងមនុស្សពេញវ័យអាយុពី 16 ឆ្នាំ ដល់ 23 ឆ្នាំ
- មនុស្សមានបញ្ហាសុខភាពមួយចំនួន ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធស៊ាំ
- មីក្រូជីវវិទ្យាដែលធ្វើការជាប្រចាំជាមួយមីក្រូបបាក់តេរី *N. meningitidis* ដែលជាបាក់តេរីបណ្តាលឱ្យកើតជំងឺ meningococcal
- មនុស្សដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យ ដោយសារតែមានករណីកើតជំងឺនេះក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេ

2. ថ្នាំវ៉ាក់សាំង Meningococcal ACWY

ក្មេងជំទង់ ត្រូវការវ៉ាក់សាំង Meningococcal ACWY ចំនួន 2 ដូស៖

- ដូសទីមួយ៖ អាយុ 11 ឆ្នាំ ឬ 12 ឆ្នាំ
- ដូសទីពីរ (ជំរុញ)៖ អាយុ 16 ឆ្នាំ

Meningococcal ACWY VIS - Khmer (8/6/21)

ក្រៅពីការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាប្រចាំសម្រាប់ក្មេងជំទង់ ថ្នាំវ៉ាក់សាំង meningococcal ACWY ក៏ត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើមនុស្សក្នុងក្រុមមួយចំនួនផងដែរ៖

- មនុស្សដែលស្ថិតក្នុងហានិភ័យ ដោយសារតែមានករណីកើតជំងឺ meningococcal បង្កឡើងដោយបាក់តេរី serogroup A, C, W ឬ Y។
- មនុស្សផ្ទុកមេរោគអេដស៍
- មនុស្សដែលខូចលំពែង ឬលំពែងត្រូវបានកាត់យកចេញ រួមទាំងមនុស្សដែលមានជំងឺ កោស កាលាមមានរាងកណ្តាញ
- ជនណាដែលមានបញ្ហាប្រព័ន្ធស៊ាំដឹកម្រ ដែលគេហៅថា “បញ្ហាខ្វះប្រូតេអ៊ីនខ្លីមីន”
- មនុស្សដែលប្រើថ្នាំប្រភេទ “ខ្វះប្រូតេអ៊ីនខ្លីមីន” ដូចជា eculizumab (ឬហៅថា “Soliris”) ឬ ravulizumab (ឬហៅថា “Ultomiris”)
- អ្នកសិក្សាមីក្រូបជីវសាស្ត្រ ដែលធ្វើការជាមួយនីមី ក្រុបញ្ចេញរបស់បាក់តេរី *N. meningitidis*
- ជនណាដែលធ្វើដំណើរ ទៅ ឬរស់នៅ តំបន់ណាមួយលើពិភពលោក ដែលកើតជំងឺ meningococcal ជាទូទៅ ដូចជា តំបន់នានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិក
- និស្សិតមហាវិទ្យាល័យដែលរស់នៅក្នុងសាលស្នាក់នៅ ដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង meningococcal ACWY គ្រប់ដួស
- យោធិ នសហរដ្ឋអាមេរិក

3. និយាយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព របស់អ្នកដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀត។

ប្រាប់អ្នកផ្តល់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក ប្រសិនបើ បុគ្គលនោះទទួលបានវ៉ាក់សាំង៖

- មានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ី បន្ទាប់ពីការទទួលវ៉ាក់សាំង meningococcal ACWY ដួសមុន ឬមានអាឡែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរណាមួយដែលគំរាមកំហែងដល់ជីវិត

ក្នុងករណីខ្លះ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក អាចសម្រេចចិត្ត ពិន្យាពេលការចាក់វ៉ាក់សាំង meningococcal ACWY រហូតដល់ការណាត់ជួបនាពេលខាងមុខ។



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

មានព័ត៌មាន មានតិចតួចទាក់ទងនឹងឯកសារនេះ ក៏ត្រូវការចាក់សាំង ចំពោះស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ឬការបំបៅដោះកូន ប៉ុន្តែបញ្ហាអសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងមិនត្រូវបានបញ្ជាក់។ ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ ឬស្រ្តីបំបៅកូនដោយទឹកដោះត្រូវទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រសិនបើមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ។

អ្នកដែលមានជំងឺស្រាល ដូចជាជំងឺផ្លាសាយ អាចទទួលថ្នាំបង្ការនេះបាន។ អ្នកដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្ងន់ធ្ងរគួររង់ចាំ រហូតដល់ពួកគេជាសះស្បើយសិន មុនពេលទទួលថ្នាំវ៉ាក់សាំង meningococcal ACWY។

អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់លោកអ្នកបាន។

4. ហានិភ័យកើតប្រតិកម្មថ្នាំវ៉ាក់សាំង

- អាការៈក្រហម ក្តៅ និងហើមនៅកន្លែងចាក់ថ្នាំ អាចកើតឡើងបន្ទាប់ពីចាក់វ៉ាក់សាំង meningococcal ACWY
- ភាគរយតិចតួចនៃអ្នកដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំង meningococcal ACWY មានការឈឺចាប់ សាច់ដុំឈឺ ក្បាល ឬអស់កម្លាំង។

ពេលខ្លះ មនុស្សស្លាប់ បន្ទាប់ពីដំណើរការវេជ្ជសាស្ត្ររួមទាំងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំង។ សូមប្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក ប្រសិនបើលោកអ្នករលួយ ឬចក្ខុញ្ញាណផ្លាស់ប្តូរ ឬឮសំឡេងហ៊ីងក្នុងត្រចៀក។

ដូចថ្នាំផ្សេងទៀតដែរ ថ្នាំវ៉ាក់សាំងកម្រនឹងបង្កប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ី ធ្ងន់ធ្ងរ ឬស្លាប់ ឬធ្ងន់ធ្ងរផ្សេង ឬធ្វើឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតណាស់។

5. ចុះបើមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ?

ប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ី អាចកើតឡើង បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលថ្នាំបង្ការចាក់ចេញពីគ្រឹះនីតិ។ ប្រសិនបើអ្នកឃើញសញ្ញានៃប្រតិកម្មអាលែហ្ស៊ីធ្ងន់ធ្ងរ (កន្ទួលក្រហម ហើមមុខ និងបំពង់ក ពិបាកដកដង្ហើម បេះដូងលោតញាប់រលួយ ឬខ្សោយ) សូមទូរស័ព្ទទៅ 9-1-1 ហើយនាំអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យដែលនៅជិតបំផុត។

សម្រាប់សញ្ញាផ្សេងទៀតដែលធ្វើឱ្យអ្នកបារម្ភ សូមទូរស័ព្ទទៅអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

ប្រតិកម្មទៅប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងគួរតែត្រូវបានរាយការណ៍ទៅ Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS)។ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកជាធម្មតានឹងដាក់របាយការណ៍នេះ ឬអ្នកអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងបាន។ សូមចូលទៅគេហទំព័រប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VAERS) www.vaers.hhs.gov ឬទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ 1-800-822-7967។ ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) សម្រាប់តែការរាយការណ៍ប៉ុណ្ណោះ។ បុគ្គលិករបស់ប្រព័ន្ធរាយការណ៍ផលអាក្រក់នៃថ្នាំ (VAERS) មិនផ្តល់ជំនួយនូវព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត។

6. កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង

National Vaccine Injury Compensation Program (កម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង (VICP)) គឺជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង់សងអ្នកទាំងឡាយដែលអាចរងរបួសដោយសារតែថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយចំនួន។ ការទាមទារទាក់ទងនឹងរបួស ឬការស្លាប់ដោយសារការទទួលថ្នាំបង្ការ មានពេលវេលាកំណត់សម្រាប់ការដាក់ឯកសារដែលអាចមានរយៈពេលខ្លីត្រឹមពីរឆ្នាំ។ សូមចូលទៅគេហទំព័រកម្មវិធីជាតិបង់សំណងរបួសដោយសារថ្នាំវ៉ាក់សាំង www.hrsa.gov/vaccinecompensation ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-338-2382 ដើម្បីសិក្សាអំពីកម្មវិធីនិងការដាក់ពាក្យទាមទារ។

7. តើខ្ញុំអាចសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយរបៀបណា?

- សូមសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់លោកអ្នក។
- សូមទូរស័ព្ទទៅក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋ ឬនៅមូលដ្ឋានរបស់លោកអ្នក។
- សូមចូលទៅ Food and Drug Administration (គេហទំព័ររដ្ឋបាលអាហារនិងឱសថ (FDA)) ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់សេវាកម្មថ្នាំបង្ការ និងព័ត៌មានបន្ថែម www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines។
- Centers for Disease Control and Prevention (សូមទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់និងបង្ការជំងឺ (CDC))៖
 - សូមទូរស័ព្ទទៅលេខ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ឬ
 - ចូលមើលគេហទំព័ររបស់ CDC នៅ www.cdc.gov/vaccines។

