

د واکسينو معلوماتي بيانیه

Many Vaccine Information Statements are available in Pashto and other languages. See www.immunize.org/vis

د واکسين معلوماتو ډېرې بيانې په پښتو او نورو ژبو موجود دي. وگورئ www.immunize.org/vis

د چیچک/د بیزو د شري واکسين (JYNNEOS™): هغه څه چې تاسو یې په اړه باید پوه شئ

1. ولې باید واکسين وکړو؟

د چیچک/د بیزو د شري واکسين (JYNNEOS™) کولی شي د چیچک د ناروغۍ، د بیزو د شري او نورو ورته ناروغیو څخه په خونديتوب کې مرسته وکړي چې د اورتنوپوکس ویروس له امله رامینځته کیږي، په کومو کې چې د واکسينیا ویروس هم شامل دي.

د چیچک ناروغي یوه ډیره جدي ناروغي ده چې د ویروس له امله رامینځته کیږي. ځینې کسان په دغه ویروس باندې د اخته کېدو خطر ته دوام ورکوي چې پایله کې د چیچک د ناروغۍ لامل کیږي، په دې ډله کې هغه کسان چې په بیرني چمتووالي کې کار کوي او د لابراتوار ځینې کارکوونکي شامل دي. یاد ویروس له یو شخص څخه بل شخص ته خپریږي، د تبي او د پوستکي د خرابت په ګډون ځینې علائم رامینځته کوي. زیاتره هغه کسان خلک چې په تیرو وختونو کې د چیچک له ناروغۍ څخه روغ شوي وي، بیا هم د هرو 10 کسانو څخه نږدې 3 یې په دې ناروغۍ اخته شوي دي.

د بیزو شری یوه نادره ناروغي ده چې نښې یې د چیچک ناروغۍ ته ورته دي خو د هغې په پرتله یې نښې کمې وي. په هر حال، د بیزو د شري ناروغي کولی شي د مړینې لامل شي. د بیزو شری په افریقا لویه وچه کې یو راپورته کېدونکی مکروب دی او کله ناکله د متحده ایالاتو په ګډون په نورو هیوادونو کې د بیزو د شري د ناروغۍ راپورل شوي پېښې رامینځته کیږي.

د واکسينیا ویروس هم هغه مهال کولی شي د ناروغۍ لامل شي کله چې یو څوک په ناروغۍ له کسانو سره مخ کیږي (لکه د هغه چا سره چې په دې وروستیو کې د ACAM2000 سره واکسين شوي وي، یا یې د بل ډول شري واکسين کړي وي) یا هم له څارویو سره مخ شي. هغه کسان چې په لابراتوارونو کې د ویروس په واکسينو کې کار کوي په تصادفي ډول له اړونده ویروس سره مخ کېدلی شي، او که چیرې دوی په ناروغۍ اخته شي نو ناروغ کېدلی هم شي. په هر حال، د واکسينیا ویروس زیاتره ککړتیاوې پرته له درملنې په خپله له منځه ځي.

2. د چیچک/د بیزو د شري واکسين (JYNNEOS™)

د چیچک/د بیزو د شري واکسين (JYNNEOS™) د کمزوریو ژوندیو واکسينو په کارولو سره جوړ شوی او نه شي کولی چې د چیچک، د بیزو د شري، یا کومې بلې ساري ناروغۍ لامل شي.



U.S. Department of Health and Human Services
Centers for Disease Control and Prevention

JYNNEOS™ په خپله د خورو او درملو د ادارې (Food and Drug Administration, FDA) له لوري په لویانو کې چې 18 کلن او یا تر هغه زیات عمر لرونکي وي د چیچک د ناروغۍ یا بیزو د شري د ککړتیا له مخې له لوړ خطر څخه د مخنیوي لپاره تصویب شوی دی.

CDC د لابراتوار اړوند د ځینو کارکوونکو او د بیرني غبرګون د کاري ډلې د غړو لپاره JYNNEOS™ واکسين د ترسره کولو وړاندیز کوي چې کولی شي له داسې ویروسونو سره مخ شي چې د اورتنوپوکس ویروس په ناروغۍ باندې د ککړتیا لامل کیږي. CDC د هغو کسانو لپاره واکسين په پام کې نیولو وړاندیز کوي چې ACAM2000 واکسين خلکو ته ورکوي، یا هغه کسان چې په اورتنوپوکس ویروس د اخته ناروغيانو پاملرنه کوي.

JYNNEOS™ واکسين زیاتره د 2 دانو ستونو د دورې په توګه، ترمنځ یې د 4 اوونيو مودې په توپیر سره ترسره کیږي. هغه کسان چې په تیرو وختونو کې یې د چیچک واکسين ترسره کړي وي ښايي یواځې د یاد واکسين 1 دورې ته اړتیا ولري.

هغو ته په هرو 2 یا 10 کلونو کې د تقویمي واکسينو د ترسره کولو سپارښتنه کیږي که چیرې یو څوک د چیچک، د بیزو د شري، یا نورو اورتنوپوکس ویروسونو سره د اخته کېدو په دواړو خطرونو کې پاتې کیږي. ستاسو روغتیاپال کولی شي په دې اړه تاسو ته ډېر معلومات درکړي.

3. له خپل روغتیاپال سره خبرې وکړئ

د واکسينو چمتو کوونکي ته خبر ورکړئ که چیرې د واکسينو ترسره کوونکي شخص ته:

د چیچک واکسينو کولو د وروستۍ دورې له امله حساسیتي غبرګون پيدا شوی وي، یا د د ژوند ګواښوونکی حساسیت ورته پيدا شوی وي د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي امیندواره وي یا فکر کوي چې دوی ښايي امیندواره شي یا هم خپلې شیدې ماشوم ته ورکوي

په ځینو حالاتو کې، ستاسو د روغتیا پال چمتو کوونکی ښايي پریکړه وکړي چې د JYNNEOS™ واکسين اړوند تر راتلونکي لیدنې (له ویروس سره د مخ کېدو) پورې د چیچک/د بیزو د شري واکسين وځنډوي.

د زکام په څېر د کوچنیو ناروغیو لرونکي خلک هم کولی شي واکسين وکړي. هغه کسان چې په منځني ډول یا سخت ناروغه وي زیاتره د JYNNEOS™ واکسين (له ککړېدو مخکې) دورې د ترلاسه کولو څخه مخکې تر رغیدو پورې انتظار باسي. که تاسو ته د بیزو د شري په ویروس باندې د اخته کېدو له امله JYNNEOS™ د واکسينو د ترسره کولو سپارښتنه شوې وي، تاسو باید واکسين وکړئ پرته له دې چې د ورته ناروغیو، امیندواړی، ماشوم ته د شیدو د ورکولو، یا د بدن د دفاعي سیستم کمزورتیا په پام کې ونیسئ.

د ضرري غبرگونونو په هکله باید د ضرري پېښو د راپور سیستم (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) ته راپور ورکړل شي. ستاسو روغتياپال زياتره دا ډول راپورونه ثبتوي، يا تاسو خپله بايد دا کار وکړئ. له VAERS وېب سايټ څخه په دې پته ليدنه وکړئ www.vaers.hhs.gov يا دې شمېرې ته زنگ ووهئ 1-800-822-7967. VAERS يو ځایي د غبرگون په اړه د راپور ورکولو لپاره دی، او د VAERS کارکونکي روغتيايي مشورې نه ورکوي.

6. د متقابل عمل اړوند د زیانونو د جبران برنامه

د متقابل عمل اړوند د زیانونو د جبران برنامه (Countermeasures Injury Compensation Program) یوه فدرالي برنامه ده چې کولی شي د روغتيايي پاملرنې د لگښتونو او د ځينو ځانگړو کسانو د نورو ځانگړو لگښتونو په تادیه کولو کې مرسته وکړي چې د ځانگړو درملو يا واکسينونو له امله سخت ټپي شوي وي. که تاسو د چيچک/د بيزو د شري د واکسين له امله زيان ليدلی وي، نو کولی شئ د يادې برنامې په اړه نور معلومات د برنامې وېب پاڼې ته ورشئ www.hrsa.gov/cicp، يا 1-855-266-2427 (855-266-CICP) شمېرې ته زنگ ووهئ.

7. څرنگه کولی شم نور معلومات لاسته راوړم؟

- له خپل روغتياپال څخه پوښتنې وکړئ.
- خپلې ځايي يا ايالتي روغتيايي څانگې ته زنگ ووهئ.
- د واکسينو په اړه د معلوماتي پاڼې او نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines له لارې د خوړو او درملو ادارې (FDA) وېب پاڼې ته ورشئ.
- د ناروغيو د کنټرول او مخنيوي مرکز (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) سره په اړيکه کې شئ: 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) شمېرې ته زنگ ووهئ يا هم د CDC له دغې وېب پاڼې ليدنه وکړئ www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox.

JYNNEOS™ کيدای شي په عمومي ډول د نورو واکسينونو د وخت په پام کې نيولو پرته ترسره شي. په هر حال، ځينې کسان چې د مايوکارډيټس (د زړه د عضلاتو پړسوب) په نوم د يوې ستونزې د زياتوالي خطر لري، چې په دې کې د ځوانو يا ځوانو نارينه وو په گډون، ښايي د کووېډ-19 واکسينونو له ترلاسه کولو څخه مخکې د JYNNEOS™ واکسينو له ترلاسه کولو څخه 4 اوونۍ انتظار ته پام وکړي. که تاسو ته د بيزو د شري په وېروس پاڼې د اخته کيدو له امله د JYNNEOS™ واکسينو د ترلاسه کولو وړانديز شوی وي، تاسو بايد واکسين وکړئ حتی که په وروستيو کې مو د کووېډ-19 واکسين هم ترلاسه کړی وي.

4. د واکسين پر وړاندې د غبرگون خطرونه

- په بدن کې د واکسين د لگولو په ناحیه کې سوروالی، درد، پړسوب او خارش هغه معمولي ستونزې دي چې د JYNNEOS™ واکسينو له ترسره کولو وروسته رامنځته کېږي.
- ستريا (ناآرامي)، سرخوږی، او د عضلاتو درد هم کله ناکله د JYNNEOS™ واکسينو له ترسره کولو وروسته رامنځته کېږي.
- خلک ځينې وختونه د واکسينو په گډون له ځينو روغتيايي کړنلارو وروسته بې هوښه کېږي. که په تاسو سرگرځېدلی وي، يا مو په ليدو کې بدلون راغلی وي يا مو په غوږ کې زنگاری وي، په اړه يې خپل روغتياپال ته ووايست.

لکه د نورو درملو په څېر، واکسين هم په ډېر نادره توگه له سخت حساسيت، نورو جدي ټپونو، يا مړينې سبب گرځېدای شي.

تاسو کولی شئ د خپل ځيرک موبایل په کارولو او vsafe.cdc.gov پاڼې څخه د ليدو له لارې د JYNNEOS™ واکسينو د هرې دورې له ترلاسه کولو وروسته په V-safe کې نوم ليکنه وکړئ. V-safe د خونديتوب څارنې يو سيستم دی چې تاسو ته اجازه درکوي ترڅو له CDC سره هغه څه شريک کړئ چې تاسو، يا ستاسو پورې تړلي، يو څوک يې د JYNNEOS™ واکسينو له ترلاسه کولو وروسته احساس کوي. د نورو معلوماتو لپاره له دې پاڼې ليدنه وکړئ www.cdc.gov/vsafe.

5. څه به کيږي که چيرې کومه جدي ستونزه شتون ولري؟

يو حساسيتي غبرگون کېدای شي هغه مهال رامنځته شي چې کله واکسين شوی کس له کلينيک څخه ووځي. که تاسو د جدي غبرگون نښې لکه (ټپونه، د مخ او ستوني پړسوب، تنفسي ستونزې، د زړه چټک ضربان، ستريا، يا کمزوري) وليدلې نو، 1-9 شمېرې ته زنگ ووهئ او اړونده شخص تر ټولو نږدې روغتون ته انتقال کړئ.

د نورو هغو علايمو لپاره چې تاسو يې په اړه اندېښنه لرئ، خپل د روغتيايي پاملرنې چمتو کوونکي ته زنگ ووهئ.

