

רעספיראַטאָרי סינקיטיאַל ווירוס וואַקצין (RSV) פרעווענטיווע אַנטיקערפּער: וואָס איר דאַרפֿט וויסן

פֿאַרוואָס צו ווערן אימוניזירט מיט אַ RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער?

אַ רעספיראַטאָרי סינקיטיאַל ווירוס (Respiratory Syncytial Virus, RSV) פרעווענטיווע אַנטיקערפּער קען אָפהאַלטן שווער לונג קראַנקייט פֿאַרשאַפֿן ביי RSV.

RSV איז אַ געוויינטלעך רעספיראַטאָרי ווירוס וואָס אין אַלגעמיין פֿאַרשאַפֿט מילד סימפטאָמס אַזוי ווי פֿאַרקילונג אָבער קען אויך ווירקן אויף די לונגען. סימפטאָמס פֿון RSV אינפֿעקציע מעגן אַריינעמען רינען נאָז, פֿאַרקלערן אָפעטיט, הוסטן, ניסן, פֿיבער אָדער באַרבלען.

אַלע קענען אינפֿעקטירט ווערן ביי RSV, און כמעט אַלע קינדער קריגן אַ RSV אינפֿעקציע ביי דעם צייט זיי זינען 2 יאָר אַלט. דערווייל מעסערט קינדער קומען אויף זיך פֿון אַ RSV אינפֿעקציע אין אַ וואָך אָדער צוויי, RSV אינפֿעקציע קען זיין געפֿערלעך פֿאַר זייגקינדער און עטלעכע יונגע קינדער, פֿאַרשאַפֿן שוועריקייט צו אָטעמען, נידעריק זויערשטאָף ניוואָן און דיכידריישאָן. אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן, RSV איז די מערסט געוויינטלעך סיבה אויף בראַנטשיאַליטיס (אַנצידונג פֿון די קליינע לופֿט וועג אין לונג) און פנעומוניאַ (אינפֿעקציע פֿון די לונגען) אין קינדער יונגער ווי 1 יאָר אַלט. קינדער וואָס ווערן קראַנק מיט RSV מעגן דאַרפֿן גיין אין שפיטאַל, און עטלעכע מעגן אָפֿילו שטאַרבן.

RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער

דעם RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער (דזשאַנעריק נאָמען Nirsevimab, האַנדלען נאָמען Beyfortus) איז אַ וואַקצינירונג וואָס פֿאַרשטערט שווער RSV קראַנקייט אין זייגקינדער און יונגע קינדער. אַנטיקערפּער זינען פֿראַקטען וואָס דעם אימונע סיסטעם פֿון קערפּער ניצט צו קעמפֿן קעגן שאַדנדיקע גערמעס. אַזוי ווי טראַדיציאָנעל וואַקצינען, פרעווענטיווע אַנטיקערפּער זינען אימוניזאַטיאָנס וואָס צושטעלן באַשיצונג קעגן אַ ספּעציפֿיש פאַטהאָגען. דערווייל ביידע זינען אימוניזאַטיאָנס, דעם וועג אין וועלכן זיי צושטעלן אימוניטעט איז פֿאַרשיידן. Nirsevimab איז אַן אימוניזאַציע וואָס צושטעלט אַנטיקערפּער דירעקט צום באַקומער. טראַדיציאָנעלע וואַקצינען זינען אימוניזאַטיאָנס וואָס סטימולירן דעם אימונע סיסטעם פֿון דעם באַקומער כדי צו פֿראַדוצירן אַנטיקערפּער.

זייגקינדער געבוירן געוואָרן במשך דעם RSV צייט (געוויינלעך האַרבסט דורך פֿרילינג) דאַרפֿן באַקומען אַן איינציקע דאָזע פֿון די RSV אימוניזאַציע במשך 1 וואָך נאָך געבוירט. מערסט זייגקינדער וועלכע מוטערס האָבן באַקומט די RSV וואַקצין דאַרפֿן ניט אויך באַקומען Nirsevimab. ביידע באַשיצן זייגקינדער פֿון שווער RSV ביי צושטעלן אַנטיקערפּער, פֿון די מוטער צום זייגקין אָדער דירעקט צום זייגקין. מערסט זייגקינדער וועלן מסתמא בלויז דאַרפֿן באַשיצונג פֿון דעם מוטערלעך RSV וואַקצין אָדער פֿון Nirsevimab (ניט ביידע). אָבער עז מעגן דאָ זיין עטלעכע סיטואַציעס אין וועלכע מען וואָלט רעקאָמענדירט Nirsevimab פֿאַר אַ זייגקין נאָך די מוטער האָט באַקומען אַ RSV וואַקצין.

זייגקינדער געבוירן געוואָרן אויסער דעם RSV צייט וואָס זינען יונגער ווי 8 מאָנאַטן אַלט דאַרפֿן באַקומען אַן איינציקע RSV אימוניזאַציע דאָזע איידער זייער ערשטן RSV צייט (געוויינלעך אין האַרבסט), אָבער זייגקינדער וואָס זינען יונגער ווי 8 מאָנאַטן אַלט וואָס האָבן ניט באַקומען אַ דאָזע מעגן באַקומען אַ דאָזע במשך דעם צייט.

עטלעכע זייגקינדער און יונגע קינדער וואָס זינען אין אַ הויך ריזק פֿאַר שווער RSV קראַנקייט מעג דאַרפֿן אַן איינציקע דאָזע פֿון דעם RSV אַנטיקערפּער איידער אָדער במשך זייער צווייטן RSV צייט.

מען קען געבן RSV פרעווענטיווע אַנטיקערפּער אין זעלבן צייט אַז רוטין וואַקצינען רעקאָמענדירט פֿאַר זייגקינדער און יונגע קינדער.

