

וואקסין אינפארמאציע סטייטמענט

Many Vaccine Information Statements are available in Yiddish and other languages. See www.immunize.org/vis

פיל וואקסין אינפארמאציע סטייטמענט זענען אוועלעב אין אידיש און אנדערע שפראכן. זעט www.immunize.org/vis

ראַטעוויירוס ירוס וואקסין: וואס איר דארפט וויסן

• האט אן אפגעשוואכטע אימיון סיסטעם
• האט די גענעטישע 'סקיד' קראנקייט

(severe combined immunodeficiency, SCID)

• האט געהאט א סארט בלאקירונג אין די קישקע וואס הייסט "אינטוסאסעפּשען" (intussusception)

אין געוויסע פעלער, וועט אייער דאקטאר מעגליך באשלוסן צו אפשטופן ראַטעוויירוס וואקסיןאציע ביז א צוקונפּטדיגע באזוך.

בייבס וואס פילן זיך מילד נישט גוט, ווי צום ביישפיל א פארקילעכץ, קענען וואקסינירט ווערן. בייבס וועלכע זענען מיטלמעסיג אדער ערנסט קראנק זאלן געווענטליך ווארטן ביז זיי דערהוילן זיך איידער באקומען דעם ראַטעוויירוס וואקסין. אייער קינד'ס דאקטאר קען אייך גיבן מער אינפארמאציע.

4. סכנות פון א רעאקציע צום וואקסין

• אומבאקוועמליכקייט אדער מילדע, צייטווייליגע דייעריע אדער ברעכן קענען געשען נאכן באקומען דעם ראַטעוויירוס וואקסין.

אינטוסאסעפּשען איז א סארט בלאקירונג פון די קישקע וואס ווערט באהאנדלט אין שפיטאל און קען פארלאנגן אן אפּעראציע. עס געשעט נאטורליך אין טייל בייבס יעדע יאר אין די פאראייניקטע שטאטן, און געווענטליך קומט עס אן א באקאנטע אורזאך. עס איז דא א קליינע אויסזיכט פון אינטוסאסעפּשען פון ראַטעוויירוס וואקסיןאציע, געווענטליך ביז א וואך נאך די ערשטע אדער צווייטע וואקסין דאזע. די עטוואס העכערע סכנה איז געשאצט צו זיין צווישן בערך 1 פון יעדע 20,000 בייבס אין די פאראייניקטע שטאטן ביז 1 פון יעדע 100,000 בייבס אין די פאראייניקטע שטאטן וועלכע באקומען דעם ראַטעוויירוס וואקסין. אייער דאקטאר קען אייך גיבן מער אינפארמאציע.

פונקט ווי מיט סיי וועלכע מעדיצין, עס זענען דא גאר קליינע אויסזיכטן אז א וואקסין זאל פאראורזאכן א שווערע אלערגישע רעאקציע, אן אנדערע ערנסטע שעדיגונג, אדער טויט.

1. פארוואס צו וואקסינירט ווערן?

דער ראַטעוויירוס וואקסין קען פארמיידן די ראַטעוויירוס קראנקייט.

ראַטעוויירוס פאראורזאכט אפט שווערע, וואסעריגע דייעריע, מערסטנס אין בייבס און אין קליינע קינדער. ברעכן און פיבער געשעען אויך אפט אין בייבס מיט ראַטעוויירוס. קינדער קענען ווערן אויסגעטרוקנט און קענען דארפן האספיטאליזירט ווערן און אפילו שטארבן רח"ל.

2. ראַטעוויירוס וואקסין

דער ראַטעוויירוס וואקסין ווערט געגעבן דורכן אריינטראפן אין דעם קינד'ס מויל. בייבס דארפן באקומען 2 אדער 3 דאזעס פון דעם ראַטעוויירוס וואקסין, געוואנדן אין די פירמע פון דעם וואקסין וואס ווערט גענוצט.

• די ערשטע דאזע מוז געגעבן ווערן פריער 15 וואכן אלט.
• די לעצטע דאזע מוז געגעבן ווערן ביז די 8 חודשים.

כמעט אלע בייבס וועלכע באקומען דעם ראַטעוויירוס וואקסין וועלן זיין באשיצט פון ערנסטע דייעריע צוליב ראַטעוויירוס.

אן אנדערער ווירוס מיט די נאמען porcine circovirus (פּאָרסין סירקאָ-ווירוס) קענען געפונען ווערן אין איינער פון די ראַטעוויירוס וואקסינען (Rotarix). דער ווירוס שטעקט נישט אן קיינע מענטשן און עס איז נישטא קיין באקאנטע ריזיקע דערפון.

דער ראַטעוויירוס וואקסין קען געגעבן ווערן אין דעם זעלבן צייט ווי אנדערע וואקסינען.

3. רעדט מיט אייער דאקטאר

זאגט דעם צושטעלער פון וואקסין אויב דער מענטש וואס באקומט דעם וואקסין:

• האט געהאט אן אלערגישע רעאקציע נאך א פריערדיגע דאזע פונעם ראַטעוויירוס וואקסין, אדער האט סיי וועלכע ערנסטע, לעבנס-סכנות'דיגע אלערגיעס



U.S. Department of
Health and Human Services
Centers for Disease
Control and Prevention

5. וואס אויב עס איז דא אן ערנסטן פראבלעם?

פאר אינטוסאָסעפּשען, קוקט פאר סימנים פון בויך ווייטאג באגלייט מיט אסאך וויינען. אין אנפאנג קענען די עפיזאדן אנהאלטן פאר בלויז אפאר מינוט און קומען און גיין עטליכע מאל א שעה. בייבס קענען ארויפציהען זייערע פיס צו די ברוסטקאסטן. אייער בייבי קען אויך ברעכן אפאר מאל אדער האבן בלוט אין די פעמפער (צואה) אדער קענען זיי אויסקוקן שוואך אדער זייער אומבאקוועם. די סימנים וואלטן געווענטליך געשען דורכאויס די ערשטע וואך נאך די ערשטע אדער צווייטע דאזע פון דעם ראָוטעוויירוס וואקסין, אבער איר זאלט זיין וואכזאם פון אזעלכע סימנים אין סיי וועלכע צייט נאך וואקסיןאציע. אויב איר טראכט אז אייער בייבי האט אינטוסאָסעפּשען, פארבינדט אייך באלד מיט א דאקטאר. אויב קענט איר נישט אנקומען צו א דאקטאר, נעמט אריין אייער בייבי אין שפיטאל. זאגט פאר די איינגעשטעלטע אז אייער בייבי האט באקומען דעם ראָוטעוויירוס וואקסין.

אן אלערגישע רעאקציע קען פארקומען נאכדעם וואס דער מענטש וואס האט באקומט דעם וואקסין פארלאזט די קליניק. אויב איר זעט סימנים פון אן ערנסטע אלערגישע רעאקציע (אויסשלאגן, אן אויפגעשוואלענע פנים און האלז, שוועריקייט צו אטעמען, א שנעלע הארץ קלאפ, א שווינדל אדער שוואקייט), רופט 1-800-911 און נעמט דעם מענטש צו דעם נאענסטן שפיטאל.

פאר אנדערע סימנים וואס באזארגן אייך רופט אייער דאקטאר. אומגעוואונטשענע רעאקציעס זאלן באריכטעט ווערן צו דעם Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) (וואקסין אומגעוואונטשענע אינצידענטן באריכטונג סיסטעם). אייער דאקטאר וועט געווענטליך זיין דער וואס וועט אריינגעבן דעם באריכט, אדער איר קענט דאס אליין טאן. באזוכט די VAERS וועבזייטל אויף www.vaers.hhs.gov אדער רופט 1-800-822-7967. VAERS איז געווינדמעט נאר צו באריכטן רעאקציעס, און VAERS שטאב מיטגלידער גיבן נישט קיינע מעדיצינישע עצות.

6. דער נאציאנאלע וואקסין שאדן פארגוטיונג פראגראם

דער National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) (נאציאנאלע וואקסין שאדן פארגוטיונג פראגראם) איז א פעדעראלער פראגראם וואס איז אוועקגעשטעלט געווארן צו פארגוטיונג מענטשן וואס זענען מעגליך געשעדיגט געווארן דורך געוויסע וואקסיןען. קליימס אין פארבינדונג מיט אנגעבליכע שאדן אדער טויט צוליב א וואקסיןאציע האבן א באגרעניצטע צייט צו אריינגעגעבן ווערן - קענענדיג זיין אזוי קורץ ווי צוויי יאר. באזוכט די VICP וועבזייטל אויף www.hrsa.gov/vaccinecompensation אדער רופט 1-800-338-2382 צו לערנען מער איבער דעם פראגראם און איבער ווי אזוי אריינצוגעבן א קליימ.

7. ווי אזוי קען איך לערנען מער?

- פרעגט אייער דאקטאר.
- רופט אייער לאקאלע אדער סטייט העלט דעפארטמענט.
- באזוכט די וועבזייטל פון די Food and Drug Administration (עסן און דראג אדמיניסטראציע) (FDA) פאר די אינפארמאציע צעטלעך וואס קומען מיט די וואקסין פעקלעך און פאר נאך אינפארמאציע אויף www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines.
- פארבינדט זיך מיט די Centers for Disease Control and Prevention (צענטערס פאר קראנקייט קאנטראל און פארמיידונג) (CDC): רופט 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) אדער באזוכט די CDC וועבזייטל אויף www.cdc.gov/vaccines.

